

4° TEST DI AUTOVALUTAZIONE (VERO O FALSO)

a) Le Russule e i Lattari si caratterizzano per la frattura gessosa del gambo.	V	F
b) Il Cantharellus cibarius è un fungo velenoso.	V	F
c) I funghi contengono clorofilla.	V	F
d) I funghi appartengono ad un Regno a sé stante.	V	F
e) I funghi si autoalimentano come le piante.	V	F
f) I funghi si riproducono per mezzo di semi chiamate spore	V	F
g) I funghi che vivono in unione con le piante sono definiti simbiotici.	V	F
h) I funghi hanno pochissime spore.	V	F
i) I funghi che hanno lamelle sono molto rari.	V	F
j) I funghi con lamelle hanno sempre l'anello.	V	F
k) I funghi che hanno le lamelle sono tutti pericolosi.	V	F
l) I funghi che hanno l'anello sono tutti commestibili.	V	F
m) Alcuni Boleti hanno la volva.	V	F
n) Nei prati-pascolo crescono funghi poco ricercati.	V	F
o) Il Marzuolo (<i>Hygrophorus marzuolus</i>) nasce nei prati.	V	F
p) I Lattari <i>deliciosus</i> e <i>sanguifluus</i> nascono nei boschi di Querce.	V	F
q) Nei castagneti si trovano soltanto funghi velenosi.	V	F
r) L'Abruzzo è ricco di faggete.	V	F
s) Il <i>pleurotus eryngii</i> nasce nei boschi di Abeti.	V	F
t) La <i>Macrolepiota procera</i> nasce soltanto nei prati.	V	F
u) Il <i>Boletus aereus</i> nasce nei boschi di abete bianco.	V	F
v) L' <i>Amanita caesarea</i> nasce nei boschi di latifoglie.	V	F
w) In Abruzzo ci sono molti boschi di Abete rosso.	V	F
x) I Lattari che secernano un liquido rossastro non sono commestibili.	V	F
y) Le <i>Macrolepiote</i> che hanno carne e gambo che al taglio diventano rossi sono commestibili.	V	F
z) Le verruche del cappello dell' <i>Amanita muscaria</i> possono scomparire con la pioggia.	V	F