

5° TEST DI AUTOVALUTAZIONE

1	La <i>Macrolepiota procera</i> viene chiamata comunemente mazza di tamburo	V	F
2	L' <i>Agrocybe aegerita</i> (<i>Cyclocybe cylindracea</i>) è la specie conosciuta come bronzino	V	F
3	Il <i>Cantharellus cibarius</i> (Galletto) è un fungo commestibile.	V	F
4	Il <i>Cantharellus cibarius</i> non ha lamelle, ma nervature simili a pieghe poco profonde.	V	F
5	Il <i>Cantharellus cibarius</i> si distingue dall' <i>Hidnum repandum</i> (Steccherino dorato) perché quest'ultimo ha sotto al cappello gli aculei.	V	F
6	I funghi vanno raccolti scavando profonde buche per prendere anche il micelio.	V	F
7	La <i>Russula cyanoxantha</i> è caratterizzata dal colore liliaceo della carne del cappello sotto la cuticola.	V	F
8	Sezionando il <i>Cantharellus cibarius</i> si nota che la carne è completamente bianca.	V	F
9	La <i>Ramaria botrytis</i> (commestibile) si distingue dalle altre specie di Ramarie perché è caratterizzata dal colore rosato delle punte terminali.	V	F
10	Il <i>Boletus edulis</i> ha il cappello untuoso.	V	F
11	Sezionando il <i>Boletus edulis</i> si nota che la carne (immutabile) immediatamente sotto la cuticola presenta una sfumatura di colore rosso vinoso, mentre per il resto appare completamente bianca.	V	F
12	Il <i>Boletus aereus</i> nasce nei prati.	V	F
13	Al gruppo di <i>Boletus</i> , chiamati comunemente Porcini, appartengono il <i>Boletus edulis</i> , il <i>B. pinophilus</i> , il <i>B. aereus</i> ed il <i>B. regius</i> .	V	F
14	Il <i>Boletus reticulatus</i> nasce d'inverno.	V	F
15	Cappello e gambo bianchi, lamelle rosa a maturazione, odore di farina, senza volva né anello è l' <i>Amanita verna</i> .	V	F
16	Il <i>Cortinarius praestans</i> conserva spesso una piccola parte del velo sul cappello.	V	F
17	L' <i>Amanita caesarea</i> allo stadio di ovolo si può confondere con l' <i>Amanita phalloides</i> .	V	F
18	Il <i>Coprinus comatus</i> presenta i tubuli sotto al cappello.	V	F
19	Le Amanite <i>phalloides</i> e <i>verna</i> sono commestibili	V	F
20	la <i>Pholiota squarrosa</i> (non commestibile) si può confondere con il chiodino.	V	F
21	Se si osserva soltanto il cappello, la <i>Russula mustelina</i> (commestibile) può essere scambiata per un porcino.	V	F
22	Un fungo mangiucchiato dalle lumache è commestibile.	V	F
23	Il <i>Boletus satanas</i> al taglio vira debolmente su toni bluastri	V	F
24	Nella <i>Russula aurea</i> (a carne dolce, commestibile) se si asporta la cuticola, sotto si trova quella colorazione giallo uovo tipica di questo fungo.	V	F
25	Il <i>Tylopilus felleus</i> (fungo del fiele, con carne molto amara) può essere scambiato con un porcino.	V	F
26	L' <i>Amanita phalloides</i> ha sul cappello liscio, color verde giallastro, le caratteristiche sottili fibrille nerastre (simili a colpetti di matita) disposte radialmente.	V	F
27	Se un fungo ha l'anello e la volva può appartenere alle specie potenzialmente mortali.	V	F